

SILTAC EC

IMOBILIZAČNÍ POSTŘIKOVÁ LEPOVÁ PAST FYZIKÁLNÍM ZPŮSOBEM ZHEHYBŇUJÍCÍ ŠKŮDCE

Produkt je na trh v České republice uváděn dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008

Obchodní název: SILTAC EC

Typ: Postřiková imobilizační past na bázi polymerů, která znehybňuje škůdce a tím zastavuje jejich aktivitu.

Složení:

Název	Obsah (% w/w)
Heptamethyltrisiloxan modifikovaný alkylenpolyoxidem	80-<100
Propan-2-ol isopropyl-alkohol isopropanol	< 0,1 % < 1
Tetraethylortosilikát	< 0,1

Označení:

Podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

Výstražné symboly GHS:



GHS07



GHS08

Pozor:

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů

P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a tvář vlažnou vodou a mýdlem

Etiketa SILTAC EC, verze 1.0. Datum 12.03.2024.

P280 – Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle a obličejový štít

P302 + P350 – Při kontaktu s pokožkou: Opatrně umyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P332 + P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P362 + P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

P501 – Obal likvidujte v s souladu s právními předpisy.

Před použitím přípravku si důkladně prostudujte návod na použití! Dbejte o to, aby se přípravek v žádném případě nedostal do tekutých a stojatých vod ve volné přírodě! Uložte mimo dosah zvířat.

ZABRAŇTE ORHOŽENÍ ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, POSTUPUJTE PODLE NÁVODU NA POUŽITÍ! V kombinaci s přípravkem na ochranu rostlin se uplatňuje přísnější klasifikace!

Distributor: Farma Bezdínek s.r.o., třída Tomáše Bati 299, 763 01 Zlín-Louky, Česká republiky, e-mail: vaclav.psota@farmabezdinek.cz, tel.: +420 725 761 112

Výrobce: ICB Pharma Tomasz Swietoslawski, Pawel Swietoslawski Spółka Jawna
Moździerzowców 6a, 43602 Jaworzno, Polsko
e-mail: crop@icbpharma.com, tel.: +48 32 74 54 700
www.icbpharma.com

Číslo šarže a datum výroby: Uvedeno na obalu výrobku

Množství: 5 litrů, 1 litr

Způsob působení: Siltac EC disponuje inovativním fyzikálním mechanismem účinku. Tento produkt obsahuje polymerní složky, hlavně v podobě silikonů. Po postřiku pokryjí jednotlivé složky rovnoměrně tělo škůdce a vytvoří na jeho povrchu specifickou strukturu v podobě trojrozměrné polymerní sítě. Tato struktura imobilizuje škůdce.

Návod k použití

Plodina, oblast použití	Účel použití	Dávkování	Ochranná lhůta
ovocné dřeviny	Drobní málo sklerotizovaní škůdci – mšice, molice, třásněnky, mery, červci, svilušky	0,15% při dávce 500 až 700 litrů vody. 0,1% při dávce 1000 litrů vody.	0
bobuloviny	Drobní málo sklerotizovaní škůdci – mšice, molice, třásněnky, mery, červci, svilušky	0,15% při dávce 500 až 700 litrů vody. 0,1% při dávce 1000 litrů vody.	0
zelenina - tykvovitá	Drobní málo sklerotizovaní škůdci – mšice, molice,	0,1%	0

	třásněnky, mery, červci, svilušky		
zelenina – lilkovité	Drobní málo sklerotizování škůdci – mšice, molice, třásněnky, mery, červci, svilušky	0,05% až 0,07%	0
salát	Drobní málo sklerotizování škůdci – mšice, molice, třásněnky, mery, červci, svilušky	0,1%	0
okrasné rostliny	Drobní málo sklerotizování škůdci – mšice, molice, třásněnky, mery, červci, svilušky	0,12 – 0,15%	0
bylinky	Drobní málo sklerotizování škůdci – mšice, molice, třásněnky, mery, červci, svilušky	0,05%	0
obilniny	mšice	0,5 l/ha do 300 – 350 litrů vody	0

Poznámka: Před aplikací je vhodné provést test fytotoxicity. Neošetřovat rostliny v době květu z důvodu rizika poškození okvěť. Pro snížení rizika popálení listů na citlivých plodinách je třeba aplikovat SILTAC EC za podmínek, které umožňují rychlé a snadné zaschnutí postřiku na listové ploše. Vhodné je provádět postřik během dne při nízké vlhkosti. Neaplikovat, pokud je v čase po postřiku očekáván déšť během 4 až 6 hodin. Postřik je možné opakovat po 7 dnech, a to až 3krát po sobě. Pak by měla následovat pauza v délce dvou až tří týdnů.

SILTAC EC je možné míchat v tank-mixu s většinou přípravků. V takovém případě je dobré provést test fytotoxicity na několika rostlinách.

Příprava postřikové kapaliny:

Správně stanovené množství produktu SILTAC EC nalijte přímo do postřikového tanku naplněného odpovídajícím množstvím vody. Poté promíchejte. V případě tank-mixu s dalšími přípravky na ochranu rostliny přidávejte SILTAC EC jako poslední. Postřiková kapaliny musí být použita během 24 hodin.

Čištění aplikačního zařízení:

Po aplikaci produktu SILTAC EC vypláchněte nádrž, rozvody a trysky čistou vodou pomocí proplachovacího zařízení alespoň 3×. Vypusťte zbytek roztoku oplachové vody a celé zařízení propláchněte čistou vodou.

Pokud návod na použití čistícího prostředku obsahuje odlišný postup čištění aplikační techniky, dodržujte tento.

Bezpečnostní opatření:

Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k požití (etiketu). Při práci používejte ochranné pomůcky. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte! Je třeba dodržovat běžné hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s biologickými přípravky na bázi makroorganismů. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Produkt nemá negativní vliv na lidské zdraví a nepoškozuje životní prostředí.

První pomoc

Všeobecné pokyny: V případě, že se objeví zdravotní problémy (např. nevolnost, přetrvávající slzení, zarudnutí, pálení očí apod.) anebo v případě jiných potíží vyhledejte lékaře.

Po nadýchání: Přerušete práci. Opusťte prostor, kde byla vykonána aplikace.

Při zasažení pokožky: Zasažené části pokožky umyjte vlažnou vodou a mýdlem. Pokožku poté dobře opláchněte. Při rozsáhlejší kontaminaci pokožky se osprchujte.

Při zasažení očí: Vypláchněte oči po dobu aspoň 10 minut velkým množstvím vlažné vody. Pokud máte nasazené kontaktní čočky, vyjměte je, je-li to možné. Zasažené kontaktní čočky není možné opět použít.

Při náhodném požití: Vypláchněte ústa vodou, případně dejte postiženému vypít pohár vody (asi 250 ml). Nevyvolávejte zvracení.

Při kontaktu s pokožkou: Okamžitě si vyslečte kontaminovaný oděv. Pokožku opláchněte vodou a mýdlem. V případě podráždění anebo alergie se obraťte na svého lékaře. Kontaminované oblečení je potřeba před opětovným použitím znova vyprat.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace z etikety nebo bezpečnostního listu. Další postup první pomoci (příp. následnou léčbu) je možné konzultovat TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Skladovatelnost:

Skladovat v teplotách 0 až 35 °C v suchých, čistých a krytých skladech.

Expirace:

4 roky od data výroby.