



ZNEHYBNĚNÍ ŠKŮDCI BEZ AKTIVITY

Siltac® EC disponuje inovativním fyzikálním mechanismem účinku. Obsahuje směs polymerních složek, především v podobě silikonů.

Po aplikaci pokryjí jednotlivé složky rovnoměrně tělo škůdce a vytvoří na jeho povrchu specifickou strukturu 3rozměrné polymerní sítě. Tato struktura imobilizuje tělesné funkce hmyzu a roztočů a dochází tak k rychlé mortalitě zasaženého škůdce.

Imobilizuje tělesné funkce
hmyzu a roztočů...

3D IPNS™
technology



Ovocné dřeviny a bobuloviny



Mšice, svilušky, vlnovníci, larvy štítenek, mery, trásněnky

0,15% (150 ml na 100 l vody),
(500–750 l vody/ha)

0,1% (100 ml na 100 l vody),
(1000 l vody/ha)

Aplikovat pouze v době, kdy podmínky umožňují rychlé zaschnutí postřiku na rostlinách (ideálně ve dne, kdy je nízká vlhkost, ne v noci a večer nebo při vyšší vlhkosti).

Aplikaci není vhodné provádět v době kvetení z důvodu rizika poškození okvěť.

Přípravek může způsobit poškození listů u některých listů zimolezu.

Zelenina a okrasné rostliny

Svilušky, mšice, molice, larvy červců, trásněnky

— **Zelenina:** 0,12–0,15% (120–150 ml na 100 l vody)

— **Tykvovité (okurky, dýně, tykve):**
0,1% (100 ml na 100 l vody)

— **Salát:** 0,1% (100 ml na 100 l vody)

— **Lilkovité (rajče, paprika, lilek) a bylinky:**
0,05–0,07% (50–70 ml na 100 l vody)

— **Okrasné rostliny a keře:**
0,12–0,15% (120–150 ml na 100 l vody)

— **Růže:** 0,1% (100 ml na 100 l vody)

— **Další okrasné:** 0,05% (50 ml na 100 l vody)

Obilniny

— 0,5 l/ha,
300–350 l vody/ha

Před aplikací na celý porost se doporučuje ošetřit pouze několik rostlin a vyhodnotit případnou fytotoxicitu. Neprovádět aplikace v době květu z důvodu rizika poškození okvěť. Aplikační podmínky musí umožňovat rychlé zaschnutí postřiku na listové ploše, tzn. provést ošetření během dne při nízké vlhkosti. Postřiková kapalina, které nezaschne na listech během několika hodin, může způsobit popálení citlivých plodin (např. rajčata, tykvovitá zelenina, gerbery, pelargonie, chryzantémy). Po aplikaci na červené zelí může dojít přechodně ke ztrátě vybarvení.

Vaši distributoři přípravku Siltac® EC




Polní plodiny, zelenina a ovoce
Ing. Marian Havlíček

☎ 603 222 356

✉ havlicek@pronachem.cz

www.pronachem.cz



Skleníky
Ing. Václav Psota, Ph.D. / Mgr. Ivana Tlolková

☎ 725 761 112 / 702 225 642

✉ vaclav.psota@farmabezdiemek.cz

www.farmabezdiemek.cz